

Preguntas 2024 octubre 19 sábado

1. Un paciente oncológico de 35 años en el postoperatorio inmediato de gastrectomía manifiesta dolor 7/10 según escala de Eva. ¿Cuál es la combinación de los analgésicos utilizados según la escala analgésica de la OMS modificada?-
 - a. fármacos no opioides, métodos ablativos, terapia adyuvante
 - b. opioides fuertes, medicamentos no opioides, terapia de adyuvante
 - c. opioides débiles, técnicas de neuromodulación, terapia coadyuvante
 - d. opioides débiles, medicamentos no opioides, terapia de adyuvante
2. Paciente de 30 años con antecedentes de enfermedad de crohn diagnosticada hace tres años refiere tener mucha sed y visión borrosa. a la valoración de enfermería paciente astenica, mucosas orales secas, vía central a nivel de subclavia derecha recibiendo nutrición parenteral total (npt) con: lípidos 250ml, aminoglucósidos 450 ml, dextrosa al 50 por ciento 300 ml, obteniendo un gasto urinario de 3 mg-kg-h. se realiza exámenes de laboratorio con los siguientes resultados: sodio NA 138 mEq -l potasio k 3.7 mEq-l, cloro 100 mEq/l, hemoglobina glicosilada HbA1c 6 % qué complicación presenta en la paciente con relación a la NPT
 - a. hipoglucemia de rebote
 - b. desequilibrio hidroelectrolítico
 - c. hiperglucemia
 - d. sobrecarga de líquido
3. Un paciente de 72 años con diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) presenta: disnea, tos crónica y expectoración mucopurulenta. A la valoración el profesional de enfermería Identifica sibilancias audibles y una disminución de la saturación de oxígeno evidenciado en resultados de gasometría arterial. ¿Cuál de las siguientes etiquetas diagnósticas de enfermería corresponde en este caso?
 - a. Riesgo de aspiración
 - b. Riesgo de deterioro de la integridad tisular.
 - c. Disminución de la tolerancia a la actividad.
 - d. Deterioro del intercambio de gases
4. Un paciente de 23 años luego de sufrir una caída desde su propia altura, presenta pérdida de la conciencia y una herida cortante en el antebrazo derecho, llega al

servicio de emergencia, recibe valoración médica y usted cumple con las indicaciones como profesional de enfermería, realiza el diagnóstico de enfermería, que implica en la utilización de los de los datos de valoración.¿A qué aplicación del proceso corresponde la toma de decisiones?

- a. Conocimiento de estándares, dificultades de comportamientos del paciente.
 - b. Agrupación de datos e identificación de los problemas de salud del paciente, formulación del diagnóstico.
 - c. Valoración diagnóstico e intervenciones.
 - d. Recogida de datos, entrevista anamnesis.
5. Mujer de 20 años primigesta que acude al servicio de emergencias por trabajo de parto en fase activa, al momento presenta contracciones regulares, dilatación de 9, borramiento del 90% y eliminación de líquido amniótico. ¿Qué formulario es indispensable en este caso?
- a. 008
 - b. 056
 - c. 053.....
 - d. 051
6. Paciente de 78 años acude al centro de salud, con antecedentes de artritis reumatoidea diagnosticada hace 5 años, refiere dolor en manos. Al examen físico el paciente presenta edema a nivel de faringes, eritema, aumento de la temperatura corporal y limitación en la articulación de manos. Por prescripción médica la enfermera administra Tramadol 100 mg y Metoclopramida 10 mg y se recomienda a la paciente continuar con las prescripciones médicas indicadas de acuerdo a la evidencia. ¿Cuál sería el tratamiento inicial para esta paciente?
- a. El uso de opioides débiles inyectar ácido hialurónico en las articulaciones o plasma rico en plaquetas.
 - b. Uso de compresas frías para generar una vasodilatación directa.
 - c. Uso de antiinflamatorios no esteroides (AINES) corticoides.
 - d. Uso de técnicas de neuromodulación o métodos ablativos
 - e. como la estimulación nerviosa transcutánea.
7. Mujer de 30 años sin antecedentes personales ingresa al servicio de emergencias por presentar debilidad hormigueo en piernas y brazos a la exploración física la paciente presenta parálisis de las piernas brazos y fasciculaciones musculares, ROTS 0/++++ se genera un diagnóstico presuntivo de síndrome de Guillain Barré se activa el

sistema de vigilancia epidemiológica inmediatamente Qué sistemas de vigilancia basada indicadores se activan inicialmente.

a. Subsistemas y SIVE alerta

b. subsistemas y SIVE de mortalidad

c. subsistemas y SIVE hospital

d. subsistemas y SIVE de vigilancia especializada

8. Un profesional de enfermería administra una dosis de gluconato de potasio en bolo sin tener en cuenta las correctas para la administración del medicamento. El Monitor muestra asistolia. Las maniobras de resucitación consiguen que sobreviva, pero con graves secuelas cerebrales. ¿Cómo se clasifica este evento?.

a. Evento centinela

b. evento adverso no evitable

c. complicación

d. cuasi evento

9. Un profesional de enfermería está trabajando en una unidad de cuidados paliativos y tiene a su cargo a un paciente oncológico, durante su turno recibe una invitación a un evento familiar se siente tentado o aceptar la invitación ya que el paciente está estable en este momento y hay otros colegas presentes en la unidad según el código deontológico del Consejo internacional de enfermería (CIE) ¿Cual de las siguientes acciones es la más coherente con los principios éticos y deberes?.

a. Acepta la invitación y entrega la responsabilidad a un colega

b. rechazar la invitación y permanecer en la unidad

c. aceptar la invitación sin informar al supervisor

d. aceptar la invitación y regresar a la entrega del turno

10. Paciente se encuentra en el servicio de terapia intensiva con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave al momento se encuentra inconsciente entubado presenta náuseas. a la valoración física se observa que el paciente necesita higiene oral por su estado de inconsciencia. ¿De qué se debe proteger el paciente durante la higiene oral?

a. vómito O emesis

b. aspiración

c. secreción salival

d. reflejo faríngeo

11. El personal de salud centro tipo b aplica el enfoque de atención primaria de salud renovada en la prestación de servicios con la perspectiva de mejorar la calidad de vida

de la población Al momento dispone de un plan local de salud alineado a las exigencias del MAIS en la valoración detecta la participación comunitaria y multisectorial en forma eficiente ¿Cuál es el enfoque central de la atención primaria renovada en el ámbito de salud en este caso?

- a. Fortalecer la atención de salud en la comunidad centrados en la prevención promoción y atención integral
 - b. priorizar la atención médica especializada para tratar enfermedades crónicas
 - c. reducir los costos de los tratamientos médicos para hacerlos más accesibles a la población
 - d. mejorar acceso a servicios de salud de alta complejidad en hospitales
12. Paciente de 18 años ingresa al área de emergencia y refiere dolor abdominal, al examen físico se evidencia abdomen distendido doloroso la palpación superficial Matidez a la percusión y ruidos hidroaéreos disminuidos a la auscultación. el médico indica colocar Sonda nasogástrica para descompresión ¿qué pasa antecede a la inserción de la Sonda?
- a. Medir desde el arca dental hasta el cuello y después hasta el apéndice xifoides
 - b. Medir desde el lóbulo de la oreja hasta la punta de la nariz y desde la nariz hacia el apéndice xifoides
 - c. medir desde el lóbulo de la oreja hacia el apéndice xifoides y luego hacia el ombligo
 - d. medir desde la punta de la nariz hacia el apéndice xifoides hasta el ombligo
13. Paciente femenina de 20 años acude a la consulta externa solicitando un turno para la atención prenatal, cursa un embarazo de 15 semanas refiere que anteriormente residía en otra ciudad y sus controles lo realizaba ahí a la valoración de enfermería la xc gestante presenta signos vitales normales y sin riesgo ¿Qué documentos necesarios que presenta la gestante para el control prenatal?
- a. La libreta integral de salud
 - b. carnet de vacunación
 - c. la prueba confirmatoria de embarazo
 - d. la cédula de identidad
14. Paciente de 28 años portadora de una sonda de alimentación gástrica con diagnóstico de VIH hace 5 años enfrentado dificultades para mantener una alimentación adecuada lo cual ha resultado en pérdida de 5 kg de peso en menos de un mes ¿Cuál es el tipo de fórmula para la nutrición enteral adecuada en este caso?

a. fórmula polimérica

b. fórmula modular

c. fórmula elemental

d. fórmula especializada

15. Paciente femenina de 60 años refiere que tiene una masa en la mama derecha sin presencia de dolor al examen físico Se observa cambios en el tamaño y temperatura de la piel además de edema médico sospecha de posible diagnóstico de cáncer de mama ¿Qué actividad de enfermería es la más adecuada en este caso?

a. Evaluar los sentimientos y conocimientos sobre su posible diagnóstico

b. Preparar a la paciente para la radioterapia

c. Preparar a la paciente para la mastectomía simple

d. Preparar a la paciente para la quimioterapia

16. Una paciente de 50 años con insuficiencia renal crónica ha sido sometida a un trasplante renal durante el periodo postoperatorio presenta oliguria dolor abdominal intenso náuseas y vómitos, presión arterial elevada y edema en los miembros inferiores. El médico diagnostica posible rechazo de trasplante renal o disfunción del injerto. como profesional de enfermería ¿Cuál de las siguientes intervenciones es la más apropiada para este paciente?

a. Administrar analgésicos y antieméticos prescritos

b. evaluar los niveles de creatinina y urea en sangre

c. colocar al paciente en posición tren del emburgo

d. aumentar la dosis de inmunosupresores según prescripción

17. Recién nacido masculino permanece en alojamiento conjunto con la madre en la sala de parto durante la atención de enfermería se realiza antropometría recibe la profilaxis ocular y antihemorrágico se inicia lactancia materna ¿Qué artículo de la Ley Orgánica de salud sustenta estas actividades?

a. Artículo 14

b. artículo 12

	Respuesta Correcta y Argumentación
	RESPUESTA CORRECTA: Artículo 6 <i>El artículo 6 menciona como reponsabilidad del Ministerio de Salud Pública: "Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus condiciones particulares".</i>

c. artículo 6

d. artículo 6

18. Paciente de 22 años se encuentra en el servicio de hematología con diagnóstico de anemia aplásica, refiere tener mucho cansancio, a la exploración física somnoliento, facias pálidas mucosas orales semihúmedas en los resultados de laboratorio se evidencia hemoglobina HB: 7g/dl, hematocrito hto: 26 g/dl, eritrocitos: 25000000/mm³, Se decide transfundir paquetes globulares ¿Qué cuidados de enfermería se deben realizar durante la transmisión de hemoderivados?

- el tiempo máximo aceptable para completar la transfusión es de 4 horas registra los signos vitales al inicio y a los 15 minutos del comienzo de la transfusión vigilar posibles eventos adversos y registro en el formulario de hemovigilancia
- el tiempo máximo aceptable para completar la transfusión es de 5 horas registrar los signos vitales del paciente al inicio y a los 15 minutos del comienzo de la transfusión vigilar posibles eventos adversos y registro en el formulario de en la vigilancia
- El tiempo máximo aceptable para completar la Transfusión es de 2 horas registra los signos vitales del paciente al inicio y a los 15 minutos del comienzo de la Transfusión vigilar posibles eventos adversos y registro en el formulario de hemovigilancia
- el tiempo máximo aceptable para completar la Transfusión es de 1 hora registrarlos sin hospitales del paciente al inicio y a los 15 minutos del comienzo de la Transfusión vigilar posibles eventos adversos y registro en el formulario de hemovigilancia

19. Paciente de 34 años soltero refiere que arrienda un cuarto está sin trabajo al momento presenta fiebre expectoración con moco sanguinolentos profesional enfermero averigua el interrogatorio que la hermana del paciente falleció con tuberculosis hace ocho días ¿Cuál es la acción correcta seguir en este caso?

- a. La búsqueda de Sr exclusivamente en visitas domiciliarias reuniones comunitarias
- b. se forma la primera muestra de esputo en 15 días en frasco previamente rotulado
- c. solicitud para examen bacteriológico y recolección de muestra de esputo para baciloscopia
- d. la segunda muestra de esputo recoger en ocho días en el domicilio del paciente

20. Niño de 2 años acude a control de niño sano en compañía de su madre en la preparación se toman las medidas antropométricas como talla 85 cm peso 12. kilogramos los signos vitales están dentro de los parámetros normales mientras esperan la atención médica Se observa que al niño le llama la atención una pelota en la sala de juegos y lo acerca a través de otro objeto para obtenerlo de acuerdo en los patrones de conducta según la edad ¿Qué tipo de desarrollo demostró el niño según la actuación?

- a. desarrollo físico
- b. desarrollo cognitivo
- c. desarrollo Lingüístico
- d. desarrollo Emocional

21. Un paciente de 55 años con Antecedentes de cirrosis hepática Crónica ingresa al hospital con sangrado gastrointestinal a la valoración presión arterial 90/60 mmHg, frecuencia cardíaca 110 lpm y temperatura 36.5 grados Celsius, paciente presenta palidez y somnolencia los resultados de laboratorio muestra una hemoglobina de 7.5 g/dl y un hematocrito de 24% en médica prescribe una transfusión de concentrado de glóbulos rojos como profesional de enfermería ¿cuál de los siguientes intervenciones es la más adecuada antes de iniciar la transfusión?

- a. Administrar antipiréticos de antihistamínicos al paciente antes del procedimiento
- b. Verifica la identificación del paciente y la compatibilidad del grupo sanguíneo y factor RH

22.

- a. Elevar la cabecera del paciente a un ángulo de 30 grados durante la Transfusión
 - b. administrar la Transfusión de concentrado de glóbulos rojos a goteo rápido
23. Profesional de enfermería se prepara para proporcionarle los cuidados post mortem antes de que el cuerpo se torne consistente debido al cambio de pH y ausencia de ácido adenil trifosfórico provocando rigidez muscular ¿Cuál es la etapa post mortem a la que se hace referencia?
- a. Lividez cadavérica o coloración cianótica
 - b. rigor mortis
 - c. descomposición
 - d. algor mortis
24. Paciente hospitalizado con un diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Al momento refiere que necesita un baño. A la valoración física se encuentra estable. Durante el baño experimenta falta de aliento y dificultades para respirar con una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto. La cama está en posición plana. ¿A qué posición se debe cambiar la cama?
- a. Posición Trendelenburg invertida.
 - b. Posición Trendelenburg.
 - c. Posición Semi-Fowler.
 - d. Posición Fowler.
25. Paciente de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial acude a la unidad de salud en área rural y han recibido por el personal de enfermería refiere sentirse agitado confuso y con dificultad para respirar al momento está taquiarritmia de 140 latidos por minuto diaforesis retracción intercostal y esternoclavicular repentinamente cae desplomado sobre la camilla lo que sugiere un paro cardiorrespiratorio ¿Cual es la primera acción al realizar según el protocolo de rcp básico?
- a. Comprobar si el paciente responde
 - b. conseguir un desfibrilador externo automático DEA y equipo para emergencias o delegar a alguien
 - c. pedir ayuda en voz alta persona cerca
 - d. activar el sistema de emergencia disponible
26. Un recién nacido tiene 4 horas de vida producto a término pesa 2800 gramos talla 50 cm perímetro cefálico 32 cm actualmente presenta apgar p8 al primer minuto de nacimiento y 9 a los 5 minutos ha permanecido en alojamiento conjunto y apego

precoz con la madre al examen físico. Se observa buen reflejo de succión y deglución ¿cuál es la profilaxis oftálmica y antihemorrágica en este caso?

a. Profilaxis anti hemorrágica 1 mg de vitamina k oftálmica con eritromicina 0.5% o tetraciclina al 1%

b. profilaxis antihemorrágica 1 mg de vitamina k profilaxis oftálmica una gota de gentamicina

c. Profilaxis Oftálmica Dos gotas de oftagen profilaxis antihemorrágica 1 mg de vitamina k

d. Profilaxis antihemorrágica 0,5 mg de vitamina K profilaxis oftálmica 2 gotas de tetrizolina

27. Pacientes femenino de 38 años de un día de hospitalización posparto tercera gestación segundo hijo vivo y un muerto sin antecedentes patológicos personales usted con la enfermera del servicio durante su turno olvida registrar la medicación analgésica luego de administrar ¿qué principio éticos está vulnerando en el paciente?

a. Principio de autonomía y continuidad

b. principio de beneficencia y no maleficencia

c. Principio de autonomía beneficencia misericordia justicia

d. principio de autonomía beneficencia misericordia y continuidad

28. Un enfermero responsable de la supervisión y gestión de las unidades de hospitalización debe elaborar el censo diario respecto al número de ingresos con el número de camas disponibles con el fin de no congestionar áreas permitir la fluidez y evitar estancias prolongadas ¿qué indicador permite elaborar el informe?

a. Giro cama

b. índice de ocupación

c. índice de rotación

d. porcentaje de ocupación

29. En la guerra de Crimea Florence Nightingale contribuyó al mejoramiento del entorno de los soldados hospitalizados ¿Qué acción realizó para demostrar al gobierno británico la necesidad de disminuir la mortalidad del 42 al 2%?

a. Fomentar la adaptación de los soldados al entorno

b. fomenta y promueve la enfermería transcultural

c. Promociona la salud para su recuperación

d. documentó y presentó datos de estadísticos sobre los elementos esenciales

30. Mujer de 35 años para que ingrese a emergencias de mal estado en general al interrogatorio sus familiares refieren parto en domicilio más presencia de ¿sangrado

en abundante cantidad luego de la atención brindada en la institución de salud la mujer falleció a la media hora por shock hemorrágico ¿Cómo se denomina este suceso?

- a. Error por omisión
- b. eventos centinela
- c. evento adverso
- d. muerte materna

31. Usted realiza una visita a domiciliaria y se encuentra una paciente femenina de 20 años que cursa un embarazo de 10 semanas al momento del interrogatorio no refiere ninguna molestia no se ha realizado ningún control prenatal y a la valoración del score de Bishop Presenta una puntuación de cero ¿qué instrumento utiliza para localizar a su paciente en una visita subsecuente?

- a. El familiograma
- b. el ecomapa
- c. la historia clínica

el mapa parlante

32. Paciente de masculino de 83 años con un hijo de 31 y antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial y diabetes mellitus desde hace 4 años con tratamiento continuo acude al control en su centro de salud en compañía de su familiar usted nota que la información que maneja el familiar de su paciente es deficiente para minimizar los riesgos de la atención en salud domiciliaria ¿Cómo se denomina la precaución para minimizar el riesgo o eliminar los peligros de Quién trabaja como cuidador?

- a. Precaución 8 higiene respiratoria
- b. precaución 3 uso de guantes
- c. precaución 2 equipo de protección personal
- d. precaución 1 higiene de manos

33. Una paciente primigesta de 35 años, ingresa al servicio de emergencia obstétrica, donde luego de la valoración: presión arterial 180/110 mmHg, frecuencia cardíaca 110 por minuto, temperatura de 36 grados centígrados, frecuencia respiratoria de 24 por minuto, saturación de oxígeno 93%, proteinuria positiva, refiere cefalea holocraneana, escotomas y zumbidos de oídos, el médico confirma diagnóstico de preeclampsia severa e indica administrar sulfato de magnesio como prevención de eclampsia; este medicamento se administra en dos fases, una de impregnación y otra de

mantenimiento. ¿Cuál es la dosis a administrar a la paciente en la fase de impregnación?

- a. 30 mililitros de sulfato de magnesio al 20% (6g) + 70 mililitros de solución isotónica, pasar a 300 ml/ hora en bomba de infusión o 100 gotas/minuto con equipo de venoclisis en 20 minutos.
 - b. La dosis es 20 mililitros de sulfato de magnesio al 20% (4 g) + 80 mililitros de solución isotónico, pasar a 300 ml/hora en bomba de infusión o 100 gotas/minuto con equipo de venoclisis en 20 minutos (4 g en 20 minutos).
 - c. 100 mililitros de sulfato de magnesio al 20% (20g) + 400 mililitros de solución isotónica, pasar a 50 ml/hora en bomba de infusión o 17 gotas /minuto con equipo de venoclisis (2 g/hora).
 - d. La dosis de 50 mililitros de sulfato de magnesio al 20% (10 g) + 450 mililitros de solución isotónica, pasar a 50 mL/hora en bomba de Infusión o 17 gotas /minuto con equipo de venoclisis (1 g/hora).
34. Paciente de 77 años Con antecedentes patológicos de evento cerebrovascular desde hace 10 años la recuperación ha sido lenta tiene limitación para varias actividades instrumentales y básicas de la vida diaria en la valoración se les presentan varios objetos de aseo personal pero no conoce sus nombres y tampoco dice que se puede hacer con ellos ¿qué alteración presenta?
- a. Ataxia
 - b. afasia
 - c. agnosia
 - d. apraxia
35. Mujer de 20 años durante la visita a domiciliaria indica que vive con su abuelo quien padece de diabetes mellitus quien ya no es autónomo y requiere de mucha atención por lo que se señala que se siente cansada por el rol que ASUME a la valoración de enfermería se identifica varias dificultades para cumplir con la responsabilidades asignadas ¿Qué función de la familia se evidencia en este caso?
- a. cuidado
 - b. reproductora
 - c. socialización
 - d. AutoNomía
36. Mujer de 30 semanas de gestación, multipara, presenta ruptura prematura de membranas horas, sensibilidad uterina. Al momento inicia trabajo de parto. 5 contracciones duración de la contracción 40 segundos: se encuentra en fase activa, 7

centimetre 80% de borramiento. Al examen físico se detecta presentación fetal cefálica longitudinal Izquierda, FCF 145 latidos por minuto, secreción uterina de mal olor. ¿Cuál complicación de la madre?

- a. Cordocentesis.
- b. Corioamnionitis.
- c. Leucomalacia.
- d. Polinidramnios

37. Paciente masculino de 25 años se encuentra hospitalizado el personal de enfermería se encuentra proporcionando un ambiente seguro y limpio sin exceso de frío valorando y cambiándolo de posición para evitar presión e irritación ¿qué intervención NIC en el manejo ambiental se está aplicando?

- a. Manejo de la energía
- b. ayuda en el autocuidado
- c. comodidad
- d. orientación en el sistema sanitario

38. Paciente de 65 años acudió la consulta externa para que refiere problemas de dolor durante las relaciones sexuales además manifiesta que sus hijos rechazan que ella tenga relaciones sexuales por su avanzada edad usted planifica una asesoría sobre sexualidad para ella y su familia ¿Qué consideraciones debe tomar en cuenta?

- a. respetar el ritmo tiempo y formas de comunicación del adulto mayor
- b. desarrollar la asesoría sin establecer límites de tiempo
- c. utilizar siempre terminología médica
- d. valora los conocimientos solo previo a la asesoría

39. Paciente femenina de 28 años embarazada acude a una consulta externa para su quinto control prenatal y refiere preocupación ya que durante su gestación ha ganado Mucho peso iniciando con un peso normal para su talla y evolucionando hasta tener obesidad ¿Cuál de las siguientes hormonas es la causante de este cambio?

- a. leptina
- b. oxitocina

40. luego de 8 semanas del parto una madre lactante acude al centro médico para solicitar una evaluación completa Refiere que no ha observado ninguna clase de secreción vaginal y necesita información sobre cuándo su cuerpo regresará al Estado normal y el apareamiento del período para poder retomar con su vida sexual ¿Cuál es la

información que se debe proporcionar para el retorno de actividad sexual posterior al puerperio?

- a. La ovulación no está marcada por el retorno del sangrado menstrual normal
- b. se inicia su vida sexual debe iniciar anticoncepción
- c. episodios de lactancia sin continuidad retrasa la evolución
- d. el sangrado no es anovulatorio

41. Un paciente de 45 años entendido en emergencia por presentar dificultad respiratoria la valoración de enfermería presenta disnea taquipnea fiebre y saturación de oxígeno de 75% al ambiente, es diagnosticado de neumonía como parte del tratamiento la prescriben oxígeno 6 litros por minuto ¿cuál de los siguientes dispositivos para administrar oxígeno es adecuado utilizar en este caso?

- a. Mascarilla sin reciclamiento
- b. mascarilla de reciclamiento parcial
- c. mascarilla aerosol
- d. mascarilla simple

42. Niño de 9 años acudió contra el médico acompañado de su madre el momento no refiere problemas ni molestias a la valoración de enfermería Se observa que la niña no registra vacuna contra el HPV razón por la cual realizan este procedimiento ¿A qué estrategia del MSP corresponde a esta actividad?

- a. atención integral por ciclos de vida
- b. estrategia Nacional de salud y nutrición
- c. detección e intervención temprana de los trastornos del desarrollo
- d. estrategia Nacional de inmunización

43. Un estudio tiene como objetivo identificar si hay diferencias en la incidencia de úlceras por presión en los enfermos a los que se realiza la prevención con la aplicación de ácidos grasos Híperoxigenados ya los que no se les aplica tras calcular el tamaño de la muestra necesaria se estudiaron a 192 pacientes que ingresaron en el centro sin úlceras por presión y que tenían la movilidad y la actividad alteradas según la escala de riesgos EMNA. La técnica de flujo continuo ha sido accidental a medida que iban ingresando los pacientes en el hospital. La incidencia de úlceras por presión es menor en el grupo de intervención lo que indica que los ácidos grasos hiperoxigenados son útiles para prevenir el desarrollo de este tipo de úlceras ¿Qué tipo de estudio es?

- a. prospectivo
- b. retrospectivo

- c. mixto
 - d. analítico
44. Un profesional de enfermería se encuentra en la fase de selección de un instrumento adecuado para evaluar los niveles de ansiedad como parte de la elaboración de una propuesta de investigación ¿En qué etapa del proceso de investigación se encuentra el profesional de enfermería
- a. Identificación del problema
 - b. análisis de los datos
 - c. ejecución del estudio
 - d. **diseño del estudio**
45. Paciente varón de 50 años hospitalizado diagnosticado de infección respiratoria presente atención arterial 135/ 80 mmhg, temperatura 38 grados Celsius, frecuencia cardíaca 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 28 respiraciones por minuto, profesional de enfermería decide implementar medidas para controlar la infección y mejorar la comodidad del paciente ¿cuál de los siguientes intervenciones refleja la aplicación del modelo de enfermería de Florence Nightingale?
- a. realizar terapia respiratoria para mejorar la función pulmonar del paciente
 - b. coordinar interconsulta con especial y está en enfermedades respiratorias
 - c. administrar antipiréticos para reducir la fiebre del paciente
 - d. **proporcionar al paciente un ambiente limpio y bien ventilado**
46. Se presenta en la unidad de salud Una gestante de 11 semanas para su primer control prenatal con preocupación a la valoración de enfermería en la anamnesis la usuaria manifestó consumo recurrente de ácido valproico carbamazepina y corticosteroides sin saber que estaba embarazada ¿Qué efecto se debe considerar?
- a. Anágeno
 - b. **teratógeno**
 - c. eutrófico
 - d. telógeno
47. Paciente de 33 años acude al área de inyectología para aplicarse a una dosis de intramuscular benzetazil 24 millones unidades internacionales por prescripción médica y diagnóstico de faringoamigdalitis. este profesional de enfermería delega la función al interno de enfermería ¿en qué sitio debe administrar el fármaco?
- a. músculo glúteo menor que descansa sobre el glúteo medio
 - b. **Músculo glúteo mayor que descansa sobre el glúteo menor**
 - c. músculo glúteo mediano que descansa sobre glúteo menor

- d. Músculo glúteo menor que descansa sobre glúteo mayor
48. Usted labora en el área de esterilización Y el responsable de la recepción de instrumental utilizado realiza la clasificación del mismo para cumplir con los diferentes procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización. ¿Qué elementos utilizan para la limpieza?
- a. agua, alcohol ,detergente, glutaraldehídos
 - b. Agua y productos enzimáticos
 - c. jabón, agua, desinfectantes químicos
 - d. alcohol medicinal e Industrial jabón líquido
49. Paciente de 9 años que durante sus 5 días de hospitalización presenta fiebre junto al revisar el registro diario de temperaturas observa un ascenso menor a 1°C en cada día. ¿Cómo se le conoce a este patrón de fiebre?
- a. Fiebre remitente
 - b. Fiebre continua
 - c. Fiebre recurrente
 - d. Fiebre intermitente
50. En una comunidad se reportan índices elevados de personas con diabetes sin control de la enfermedad por lo tanto el establecimiento de salud decide ejecutar una intervención a la valoración de enfermería se propone que sería oportuno educar sobre el autocuidado y prevención de las complicaciones ¿Qué técnica educativa y comunicacional es la más adecuada para este caso?
- a. Minga
 - b. Salas de espera
 - c. Casa abierta
 - d. Comunicación virtual
51. En un hospital de segundo nivel los resultados de los impuestos aplicadas a las pacientes indican insatisfacción en atención de enfermería ¿Qué acción debe desarrollar el líder del servicio para mejorar la satisfacción del cliente?
- a. Realizar un proceso de mejora continua para cambiar la percepción de los pacientes
 - b. mantener el sistema actual de trabajo y esperar nueva información
 - c. aplicar sanciones de acuerdo con el reglamento institucional al personal de enfermería por los resultados obtenidos

d. cambiar de Servicios al personal de enfermería

52.

Autora	Marco para la practica
1.- Orem	A.- La enfermera manipula el entorno del paciente para incluir: sonido nutrición higiene luz comodidad socialización y Esperanza adecuados
2.- Peplau	B.- Las enfermeras ayudan al paciente a realizar sus necesidades básicas
3.- Nightingale	C.- El cuidado enfermero es necesario cuando el paciente es incapaz de satisfacer las necesidades biológicas psicológicas de desarrollo o sociales
4.- Henderson	D.- Las enfermeras participan en la estructuración de los sistemas sanitarios para facilitar las relaciones interpersonales

- 1a, 2b, 3c, 4d
- 1c, 2d, 3a, 4b
- 1b, 2c, 3d, 4a
- 1d, 2a, 3b, 4c

53. Una gestante de 27 años de 38 semanas de embarazo fue intervenida quirúrgicamente por parto por cesárea se mantiene en hospitalización a la valoración de enfermería presenta tos falta de aire, miembros inferiores e inspecciona que existe edema dolor sensación de calor local y color violáceo ¿Qué problema tiene la puerpera?

- a. enfermedad tromboembólica
- b. infección de la herida
- c. erisipela
- d. varices Post cesárea

54. Luego de una última valoración de una nota se entrega a su madre con verificación Cruzada en el servicio de obstetricia y se le explica las indicaciones para domicilio incluido las citas de los próximos controles ¿Cuándo se debe retirar el brazalete de identificación?

- a. En la última toma de signos vitales
- b. en el último examen de sangre realizado
- c. cuando llegue a su casa
- d. al vestirse con su ropa casual para egresar

55. Paciente de 53 años acude a la consulta externa que refiere sofocos fatiga dolores de cabeza e irritabilidad. Al interrogatorio manifiesta que ha cambiado su libido ausencia de menstruaciones desde hace 15 meses y cambios de humor frecuentes. ¿Qué acontecimiento está cursando la paciente?
- a. Perimenopausia
 - b. menopausia prematura
 - c. menopausia
 - d. posmenopausia
56. Está realizando un barrido documentado de vacunación en niños menores a 5 años casa a casa. ¿Qué modalidad de atención es la que está aplicando?
- a. Extramural
 - b. Domiciliaria
 - c. prehospitalaria
 - d. intramural
57. Madre acude con su hijo de 6 meses acude a CS al control de niño sano a la valoración de enfermería no se identifican alteraciones en los signos vitales ni en los reflejos arcaicos y durante la aplicación del test de Denver 2 se presentan todas las dimensiones normales para la edad a ¿Qué programa del MSP responde la actividad de valoración al lactante?
- a. Detección temprana y escolar de discapacidades auditivas en el Ecuador
 - b. estrategia Nacional de inmunizaciones
 - c. Detección e intervención temprana de los trastornos del desarrollo
 - d. atención integral por ciclos de vida
58. Madre de 32 años acude a cita programada a los 8 días postparto. Actualmente hematocrito de valores normales, mamas hipersecretoras, loquios serohematicos en moderada cantidad de características propias, episiorrafia en buen proceso de cicatrización. En exploración física se encuentran involución uterina. ¿Qué tipo de cambios fisiológicos experimenta la puérpera?
- a. Depresión posparto
 - b. Progresivos
 - c. Psicológicos
 - d. Regresivos
59. Paciente primigesta de 25 años cursa un embarazo de 10 semanas acude el control prenatal refiriendo que no se ha estado alimentando adecuadamente por que presenta muchas náuseas y vómitos. a la valoración de enfermería identifica que el peso

anterior se encontraba dentro del Rango normal ¿Qué se debe hacer para evaluar la ganancia de peso en el nuevo mes?

- a. Estimar EG con la FUM
- b. solicitar una ecografía obstétrica
- c. medir y registrar los signos vitales
- d. medir y registrar PESO Y talla calcular el imc

60. Los mapas parlantes son instrumentos técnicos y metodológicos que permiten conocer en forma gráfica los actores sociales del proceso vivido por actores locales, los factores de riesgo y de protección ambiental estilos de vida sanitaria y biológica ¿Cuáles son los pasos para elaborar el mapa parlante?

- a. Actualización del croquis, coordinación con comités de la comunidad, ejecución de visitas domiciliarias
- b. asignación de la población, Identificación de necesidades y problemas de la población
- c. actualización del censo información actualizada de la población, y mapeo de parlante
- d. elaboración del croquis,sectorización, IDENTIficación de sectores y familias de riesgo

61. ¿Cómo se denomina a la actividad quirúrgica cuya indicación surge como consecuencia de una patología aguda grave de la madre o del feto con riesgo vital materno fetal que hace aconsejable la finalización del embarazo rápidamente?

- a. Cesárea de urgencia
- b. Parto instrumental
- c. Episiotomía
- d. Cerclaje cervical

62. Paciente Mujer de 48 años en recuperación post anestésica luego de reducción abierta más fijación interna por fractura subcapital de húmero derecho al momento alerta orientada constantes vitales dentro de parámetros normales, apósitos de herida quirúrgica ligeramente manchados de líquidos serohemático, presenta parestesias y disminución de la movilidad de los dedos del miembro afectado. ¿Cuál de las siguientes es la valoración más adecuada en esta paciente ?

- a. De la función respiratoria
- b. Del estado neurovascular
- c. De la función cardiovascular
- d. Neurológica

63. Madre de varón de 3 años acude al área de emergencia refiere que hace una hora el niño ingirió de forma accidental insecticida organo fosforados presentando somnolencia, sialorrea, náuseas, palidez, incontinencia urinaria y digestiva, miosis, diaforesis. ¿Cuál es el antídoto para administrar al niño ?
- a. Atropina
 - b. Bicarbonato de sodio
 - c. Fisostigmina
 - d. Naloxona
64. Paciente masculino de 27 años acude el servicio de emergencia por presentar disnea tos productiva y cianosis periférica a la valoración presenta signos vitales temperatura 39 grados Celsius, frecuencia respiratoria 26 por minuto 110 pulsaciones por minuto y una presión arterial de 140/ 90 milímetros de mercurio. ¿Con qué alteraciones está el paciente?
- a. normotérmico, apneico, bradicárdico y normotenso
 - b. hipotérmico, bradipneico, bradicárdico, hipotenso
 - c. Hipertérmico, taquipneico, taquicárdico, hipertenso
 - d. hipotérmico, taquipneico, taquicardico, normotenso
65. Un enfermero que se encuentra en su turno de la tarde en el área de emergencia se le asigna la tarea de asistir en una sutura pequeña al término del procedimiento inmediatamente se retira los guantes ¿Qué tipo de higiene de manos se debe realizar?
- a. fricción antiséptica prequirúrgica
 - b. fricción antiséptica
 - c. lavado social
 - d. lavado antiséptico
66. Paciente con diabetes tipo 1, acude a emergencia por presentar vómitos y deposiciones diarreicas por varias ocasiones, se realiza una glucemia y se evidencia 400mg/dl. El médico le indica iniciar el tratamiento para cetoacidosis diabética. ¿Cuál es la intervención prioritaria del profesional de enfermería?
- a. controlar el electrolito Na en pruebas de orina
 - b. registrar ingresos en la hidratación del paciente
 - c. administrar volumen de líquidos parenterales
 - d. realizar una electrocardiograma y reparar alteraciones
67. El profesional enfermero jefe de servicio se caracteriza por tomar decisiones sin participación del grupo, asignar el trabajo sin ofrecer explicación, es dominante, es

personalizado en los elogios y las críticas al grupo. ¿Qué tipo de Liderazgo ejerce este enfermero de acuerdo con la teoría de los estilos de Liderazgo?

- a. Democrático
- b. complaciente
- c. liberal
- d. autocrático

68. En el quirófano de una laparotomía exploratoria y antes del cierre de la herida quirúrgica Los profesionales de enfermería circulante e instrumentista realizan el conteo de material blanco y se percatan que falte una compresa ¿Cuál es la primera acción que se debe realizar?

- a. Iniciar la búsqueda de la compresa
- b. solicitar una radiografía
- c. realizar el informe del incidente
- d. informar al cirujano y repetir el recuento

69. Un profesional de enfermería está realizando el plan de egreso de un adulto mayor de 65 años con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y parkinson e indica a la hija que debe retirar las alfombras del piso para la prevención de caídas en domicilio. ¿Bajo qué meta paradigma de teorizante actúa?

- a. dorothea orem
- b. betty neuman
- c. callista roy
- d. virginia henderson

70. Un paciente de 56 años ingresa a la sala de emergencias con dolor torácico opresivo escala de Eva 10 sobre 10, sudoración profusa, disnea y palidez. El electrocardiograma muestra elevación del segmento ST en las derivaciones anterolaterales. El médico indica que es un infarto agudo de miocardio IAM. Al realizar la valoración inicial, el enfermero identifica la presencia de signos y síntomas que respaldan el diagnóstico médico. ¿Cuál de las siguientes etiquetas diagnósticas de enfermería es prioritaria?

- a. Dolor agudo
- b. riesgo de deterioro de la función cardiovascular
- c. deterioro de la integridad cutánea
- d. ansiedad

71. ¿Cuál es la clasificación de los servicios de salud por niveles de atención según el MAIS-FSC?

- a. prehospitalaria, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención
- b. primer nivel, segundo nivel, tercer nivel de atención
- c. primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, y cuarto nivel de atención
- d. primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel de atención y prehospitalario

72. Mujer de 30 años, durante la visita domiciliaria refiere que su familia está conformada por ella, su esposo y su hijo, a la valoración de enfermería se identifica que es una familia funcional sin riesgos, en donde ambos esposos estuvieron casados y tienen hijos con sus parejas anteriores. ¿A qué tipo de familia corresponde el caso?

- a. Extendida
- b. de acogida
- c. comunal
- d. mixta

73. En la actualidad la salud digital ha creado sistemas de registros clínicos electrónicos, que de la enfermería. Al momento se trabaja con algunas herramientas en la práctica clínica para el registro de datos. Se observa en unidades MSP su trabajo en la plataforma de salud PRASS. ¿Qué registra enfermería en el sistema PRASS?

- a. Acceso al campo de signos vitales y datos antropométricos
- b. actividades y procedimientos de la gestión de enfermería
- c. información que el médico u otro profesional puede modificar
- d. acceso a la productividad “diaria,” “mensual”

74. Paciente de 37 años de postoperatorio inmediato de colecistectomía, Permanece en reposo relativo, desde hace 7 horas refiere vértigo, lo que le impide **movilizarse y manifiesta incomodidad**. ¿Cuál sería el cuidado prioritario de enfermería para asegurar su higiene y confort en este caso?

- a. realizar el baño de Esponja
- b. climatizar la habitación
- c. ayudar a la deambulación
- d. cambiar pijama y frazadas

75. Paciente de 37 años, en reposo relativo tras una colecistectomía ha comenzado a presentar vértigo durante las últimas 7 horas, lo que le impide caminar. También reporta **diaforesis e incomodidad**. ¿Cuál es la intervención de enfermería más adecuada para garantizar la higiene y el confort en este caso?

- a. realizar el baño de Esponja
- b. climatizar la habitación

- c. ayudar a la ambulación
- d. cambiar pijama y frazadas

76. Paciente masculino de 45 años es llevado al quirófano para resolución quirúrgica de emergencia. Durante el trans quirúrgico el cirujano solicita al instrumentista preparar una solución con heparina y otra con antibiótico, debido al estrés del momento se confunden las soluciones preparadas, el médico solicita la con heparina, pero el instrumentista le pasa la solución con antibiótico. el instrumentista reconoce su error frente al equipo quirúrgico y lo soluciona de inmediato. ¿Cuál es el atributo característico que presenta el instrumentista quirúrgico al reconocer su error?

- a. autocontrol emocional
- b. habilidades para la resolución de problemas
- c. honestidad y conducta ética
- d. habilidades organizativas

77. El personal de enfermería realiza una visita domiciliaria a paciente masculino de 48 años que según dispensarización del grupo 4, Sufre de deterioro psico orgánico grave secundario por múltiples infartos cerebrales desde hace un año, Durante los dos últimos años ha requerido múltiples hospitalizaciones por neumonías a repetición e infecciones de escaras y vive con su señora, quién se está encargando de atenderlo. Actualmente está postrada en su cama y se encuentra en mal estado nutritivo y frente a un nuevo cuadro de neumonía, con mala respuesta a tratamiento domiciliario. la licenciada procede a la valoración de signos vitales y observación de la piel en zonas de presión, al examen físico se destacan lesiones cutáneas en manos y pies, sugerentes de sarcoma de kaposi previo consentimiento informado de práctica pruebas para detección de VIH, resultando reactivo a test hizo confirmación la profesional recomienda valoración médica y traslado al hospital para apoyo de servicio social. ¿ Principio bioético aplicó la profesional?

- a. beneficencia
- b. no maleficencia
- c. autonomía
- d. justi

complicaciones	Acciones de enfermería
1.- Isquemia del miocardio	A.- suspende el anticoagulante y notificar
2.- hemorragia y	B.- aportar hidratación correcta

formación de hematoma	
3.- insuficiencia renal aguda	C.- aplicar compresión manual
4.- hematoma retroperitoneal	D.- administrar oxígeno y nitroglicerina

e. 1a, 2b, 3d, 4c

f. 1c, 2d, 3a, 4b

g. 1d, 2c, 3b, 4a

h. 1b, 2a, 3c, 4d

78. Paciente de 20 años acude al centro de salud y es diagnosticado con amigdalitis aguda sin antecedentes personales, el médico prescribe penicilina 1,200,000 unidades internacionales. Usted como personal de enfermería realizan la prueba de sensibilidad al medicamento. ¿ Qué vía de administración utiliza para realizar esta prueba?

a. vía subcutánea

b. vía intravenosa

c. vía intramuscular

d. vía intradérmica

79. Paciente femenino de 60 años refiere que tiene una masa en la mano derecha sin presencia de dolor, al examen físico se observa cambios en el tamaño y temperatura de la piel además de edema, médico sospechó posible diagnóstico de cáncer de mama. ¿ Qué actividad de enfermería es la más adecuada en este caso?

a. Preparar a la paciente para la radioterapia

b. evaluar los sentimientos y conocimientos sobre su posible diagnóstico

c. preparar a la paciente para la mastectomía simple

d. Preparar a la paciente para la quimioterapia

80. Paciente femenino de 15 años en una visita a domiciliaria refiere mala comunicación con sus padres, Conflictos frecuentes y como producto de ello bajo rendimiento académico. en la valoración enfermera identifica que se trata de una familia disfuncional. ¿ en base a qué dominio de la Nanda construye el diagnóstico para esta familia?

a. dominio 7 relación de roles

b. dominio 5 percepción cognición

c. dominio 1 promoción de la salud

d. dominio 10 principios de vida

81. Mujer de 23 años primípara permanece en sala de partos en conjunto con su recién nacido masculino a término. Durante el parto no se presentan complicaciones ni riesgos, la mujer solicita información sobre cuándo se debe iniciar la lactancia materna. ¿ Qué información le ofrece?

- a. iniciar la lactancia materna una hora después de abandonar la sala de partos
- b. inicia la lactancia materna cuando pase a hospitalización
- c. inicia la lactancia materna cuando pase a recuperación
- d. **iniciar la lactancia materna dentro de la primera hora ,antes que abandone la sala de partos**

82. Paciente de 21 años llega al servicio de ginecología para tratamiento clínico y usted como personal de enfermería debe proporcionar cuidados de la salud y ejercer los principios bioéticos ¿Qué principios debe tener en cuenta?

- a. Unidad, beneficencia, integridad y no maleficencia
- b. **Autonomía, beneficencia, no maleficencia y Justicia**
- c. Individualidad, beneficencia, integridad y Justicia
- d. Autonomía, beneficencia, misericordia y continuidad

83. Un paciente de 65 años está recibiendo una transfusión sanguínea debido a una anemia crónica. durante la Transfusión el paciente presenta escalofríos, fiebre, taquicardia y dolor lumbar.¿Cuál es la intervención prioritaria que debe realizar el profesional de enfermería?

- a. **detener inmediatamente la transfusión sanguínea**
- b. informar al paciente que estos síntomas son normales durante una transfusión
- c. aumentar la velocidad de la Transfusión para terminar más rápido
- d. administrar medicación analgésica al paciente

84. Durante una consulta de control para vacunación, una madre lleva a su hijo de 2 años y 1 mes. Tras la evaluación de la enfermera, se constata que el niño ha recibido las dos dosis de Sarampión, Rubéola y Parotiditis, además del cuarto refuerzo para difteria tétanos y tosferina, y completó las vacunas del primer año de vida. Actualmente, se está realizando una campaña para vacunar contra la influenza. Según la normativa del Ministerio de Salud Pública, ¿Cuál vacuna no debería administrarse en este momento?.

- a. Fiebre amarilla
- b. Influenza
- c. **Varicela**

d. Poliomiелitis.

85. Un recién nacido masculino de 16 horas de vida, producto de un parto a término con un peso de 3200 g, recibe la inmunización con la vacuna BCG (Bacilo Calmette-Guérin). ¿Qué tipo de protección inmunitario ha adquirido el recién nacido?

- a. Inmunidad activa naturalmente adquirida
- b. Inmunidad activa patológicamente adquirida
- c. Inmunidad activa biológicamente adquirida.

d. Inmunidad activa artificialmente adquirida

86. Un equipo de profesionales del centro de salud se moviliza para dar asistencia a una comunidad rural donde persisten desigualdades en las condiciones socioeconómicas. Durante la visita domiciliaria una familia refiere la falta de infraestructura sanitaria hace varios años y enfermedades parasitarias. La profesional de enfermería observa diferentes factores intermedios relacionados con prácticas sanitarias inadecuadas de la vivienda y en la toma de decisiones del cuidado de los padres al niño menor de 2 años. ¿En cuál determinante de salud trabaja el profesional enfermero?

- a. Ambiental
- b. Biológico
- c. Conductual

d. Social

87. Un enfermero está a cargo de la extracción y la colocación de una vía intravenosa en un paciente que presenta sospecha de hepatitis C. ¿Qué principio de Bioseguridad debe implementarse para prevenir riesgo de infección durante este procedimiento?

a. Uso de barreras físicas.

- b. De bioética
- c. De inmunización
- d. De asepsia

88. Un recién nacido de madre Rh- y padre Rh +, con hemoglobina de 11g/dl, se evalúa en sus primeras horas de vida. Con esta información ¿Qué tipo de anemia es la más probable en este caso?

a. Anemia por pérdida sanguínea.

b. Anemia por aumento de la destrucción de hematíes

c. Anemia fisiológica.

89. Un profesional de enfermería ha sido asignado para evaluar la eficacia de un protocolo de atención recientemente implementado en su institución, con el objetivo

de disminuir las infecciones intrahospitalarias. ¿Qué tipo de investigación sería la más adecuada para obtener resultados fiables en este caso?

a. Investigación experimental

b. Investigación correlacional

c. Investigación descriptiva

d. Investigación exploratoria.

90. Mujer de 50 años refiere pérdida inexplicable de peso polidipsia y poliuria sin otros síntomas acompañantes según las guías de práctica clínica del msp del Ecuador Cuál es el criterio diagnóstico para diabetes mellitus tipo 2

a. Glucemia en plasma después de la carga oral de glucosa igual o mayor a 126 mg/dl

b. Hemoglobina glicosilada A1c (HbA1c) mayor o igual a 5.6%

c. glucemia en ayuno medida en plasma venoso igual o mayor a 110 mg/dl

d. glucemia casual en plasma venoso igual o mayor a 200 mg/dl

91. Un paciente de 24 años de edad sin antecedentes patológicos personales acude a consulta nutricional. Al examen físico presenta signos vitales dentro de parámetros normales. IMC 23 kg/m². La paciente manifiesta que tiene patrones alimentarios adecuados, se identifica como Musulmana, por lo que no consume cerdo. Es referida del área de salud mental debido a su ansiedad por comer. ¿Cuál es el término que define los principios, normas y creencias que tiene la paciente?

a. moral

b. ética

c. dignidad

d. deontología

92. mujer de 20 años casada, de profesión estudiante, acude al centro de salud porque refiere haber sufrido recientemente insultos, gritos y menosprecio por parte de su esposo, manifiesta que este acontecimiento se repite con frecuencia y que ha repercutido de manera negativa en su vida académica y social. ¿A qué tipo de violencia hace referencia?

a. física

b. sexual

c. basada en el género

d. psicológica

93. Durante el paro nacional, varios profesionales de la salud no llegaron a su establecimiento de salud de base, por lo que tuvieron que trasladarse a otros centros a

cumplir con sus horas laborales. En el centro de salud Santa Bárbara se optó por realizar visitas domiciliarias a familias con niños menores de 3 años, aprovechando los servicios de una licenciada en terapia del lenguaje, en este sentido. ¿Qué criterio se tomó en cuenta para la selección de esta modalidad de atención a las familias mediante visitas domiciliarias?

- a. criterio demográfico
- b. criterio administrativo
- c. criterio socioeconómico
- d. criterio epidemiológico

94. paciente masculino de 40 años con diagnóstico de cáncer de próstata. Al momento acude a su sexta sesión de quimioterapia ambulatoria. El paciente manifiesta que en los últimos días ha presentado fatiga que limita su capacidad para participar en actividades. ¿Qué bienestar del paciente está afectado?

- a. espiritualidad
- b. físico
- c. psicológico
- d. social

95. Paciente de 24 años en segundo día de hospitalización en el área de cirugía general, Con diagnóstico de apendicitis flemonosa, se le realizó una laparotomía exploratoria, al momento, refiere dolor abdominal. a la exploración física paciente despierto abdomen distendido, ruidos hidroaéreos disminuidos, con presencia de un drenaje Jackson pratts e hipocondrio derecho, eliminando líquido seroso, 30 ml en 24 horas. ¿Qué características tiene este sistema drenaje?

- a. Drenaje tipo T, puede ser abierto cerrado y tiene una acción por gravedad
- b. dispositivo pasivo, flexible de forma cóncava que actúa por capilaridad
- c. drenaje activo, cerrado, aspiración negativa, con aproximada de 100 ML
- d.
- e. drenaje positivo, abierto, no aspirativo formado por un fragmento de Goma

96. Una enfermera investigadora Está realizando un estudio en el que divide al azar al 80 pacientes de sexo masculino entre 20 a 40 años, fumadores, que asisten a una clínica de apoyo, específica para dejar de fumar. La enfermera tiene la intención de comparar la efectividad del tratamiento estándar con el programa educativo, con el objetivo de

determinar cuál de los dos enfoques es más eficaz. ¿Qué tipo de muestras se está usando?

- a. por conveniencia
- b. conglomerados
- c. bola de nieve
- d. aleatorio

97. Paciente masculino de 36 años, es traído al centro de salud por familiares, por presentar caída de aproximadamente de 4 metros de altura, al ingreso estuporoso, frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 24, temperatura de 36.5, saturación de oxígeno de 95% al aire ambiente, vía aérea permeable, columna cervical sin alteración, tórax normal, abdomen normal, cabeza herida de 5 cm en cuero cabelludo en región temporo.parietal derecha, Glasgow 8/15, pupilas normorreactivas. ¿Cuál será su conducta inicial?

- a. tramitar tomografía simple de cráneo
- b. intubación endotraqueal y traslado a hospital de mayor nivel
- c. observar por 6 horas y reevaluación
- d. canalización de dos vías periféricas y traslado a hospital de mayor nivel.

98. Paciente masculino de 80 años hospitalizada y diagnosticada con insuficiencia cardíaca. Al momento presenta dificultad respiratoria, fatiga la exploración física, presenta edema en extremidades inferiores y +/-+++ requiere asistencia para iniciar con nada deambulación. ¿Qué riesgo principal puede presentar al momento de iniciar la deambulación?

- a. Taquicardia
- b. hipotensión ortostática
- c. hipertensión
- d. bradicardia

99. Paciente femenino de 80 años en el área clínica con un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Al momento se encuentra dependiente, inquieta, agitada. ¿Cuál es la primera medida a tomar en este caso para evitar riesgo?

- a. Adelantarse a las necesidades
- b. proporcionar intimidad en el momento necesario
- c. dejar las barandillas levantadas al alejarse de la cabecera
- d. ofrecer ayuda cuando sea necesario

100. Madre acude al centro de salud con su hijo de un año por presentar cuadro de dos días de evolución con disnea, taquipnea de tiraje subcostal e intercostal, La saturación

se encuentra en 78% siendo necesario la administración de oxígeno por medio de un sistema de alto flujo.¿ Qué dispositivo de oxígeno de alto flujo debe colocar a este niño?

- a. Mascarilla Venturi
- b. cánula nasal pediátrica
- c. mascarilla simple
- d. mascarilla con reinhalación parcial

101. Primigesta con 36 semanas de gestación ingreso a la unidad de salud a la valoración de enfermería presenta estado de conciencia alerta, signos vitales frecuencia cardíaca 119 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 20 respiraciones por minuto, presión arterial 140 sistólica, diastólica 110 mm de Mercurio, temperatura 37 grados centígrados, saturación de oxígeno 96%, proteinuria 2 cruces en tirilla reactiva. En el examen físico el profesional enfermero encuentra edema en extremidades inferiores. aplicando la escala de SCORE MAMA.¿Cuál es el puntaje y pasos a seguir en este caso?

- a. puntaje 6 aplicar SCORE MAMA cada hora y registrar
- b. puntaje 11 aplicar SCORE MAMA cada dos horas y registrar
- c. puntaje 8 aplicar SCORE MAMA cada 30 minutos y registrar
- d. puntaje 4 aplicar SCORE MAMA cada 4 horas y registrar

102. ¿Cuáles son los componentes del metaparadigma enfermero?

- a. Salud, teoría, conceptos, entorno.
- b. Enfermería, médicos, salud, paciente.
- c. Persona, entorno, salud, enfermería.
- d. Persona, salud, entorno, teoría.

103. Un equipo de profesionales del Centro de Salud se movilizan para dar asistencia en una comunidad rural donde persisten desigualdades en las condiciones socioeconómicas. Durante la visita domiciliaria, una familia refiere la falta de infraestructura sanitaria desde hace varios años y enfermedades parasitarias. La profesional de enfermería observa diferentes factores intermedios relacionados con prácticas sanitarias inadecuadas de la vivienda y en la toma de decisiones del cuidado de los padres al niño menor de dos años. ¿En cuál determinante de la salud trabaja el profesional enfermero?

- a. Ambiental.
- b. Social.
- c. Biológico.

d. Conductual.

104. Paciente masculino de 48 años ingresa al servicio de emergencia por una caída, refiere cefalea intensa (escala de EVA 8/10), acúfenos y escotomas de una duración de 2 horas aproximadamente. Se decide su ingreso para observación y realización de pruebas de imagen. ¿Cuáles son los signos de alarma de alteración neurológica que el profesional de enfermería debe valorar?
- a. Dolor o molestia torácica, edema periférico y palpitaciones.
 - b. Dolor abdominal, dispepsia, náuseas, vómitos y diarrea.
 - c. Disnea, convulsiones, dolor torácico y hemoptisis.
 - d. **Dolor, convulsiones, vértigo y debilidad muscular.**
105. Paciente de 67 años, con dolor epigástrico, reflujo de larga evolución acude a consulta externa de cirugía, al ser referido desde gastroenterología con diagnóstico de hernia hiatal tipo 1 por deslizamiento de 5 cm. al examen físico el cirujano constante dolor epigástrico intenso y exámenes de imagen acordes con el diagnóstico, se programan cirugía laparoscópica para corregir la hernia hiatal. ¿qué complicaciones consideraría con este tipo de cirugía?
- a. **trombosis venosa**
 - b. Alcalosis respiratoria
 - c. aumento del retorno venoso
 - d. disminución de catecolaminas
106. Una gestante de 18 años acude a su primera consulta prenatal a las 15 semanas de embarazada Refiere que su hermano tiene un cuadro de varicela y solicita información sobre prevención de esta enfermedad. Al momento está asintomático y al examen físico está afebril. ¿Cuál es la recomendación para la paciente acerca de las vacunas?
- a. **Si no ha sido vacunada contra varicela, se recomienda la vacuna después del parto**
 - b. Si fuera seronegativa para rubéola se recomienda vacunarse durante el embarazo.
 - c. Administrar la primera dosis antitoxina tetánica después de las 20 semanas.
 - d. Puede recibir vacunas con virus vivos atenuados durante el embarazo.
107. Una paciente de 18 días de nacida a término por parto céfalo-vaginal con peso adecuado. Acude al centro de salud por presentar taquipnea, tos que moviliza secreciones, aleteo nasal, vómito en número de 5. Al examen físico FR: 65 rpm, rinorrea transparente, pulmonar con murmullo vesicular conservado, leve estridor laríngeo. Se decide su ingreso a observación y se requiere hidratar a la paciente. ¿Cuál

de los siguientes enunciados es un objetivo de la reposición de los líquidos de mantenimiento en esta paciente?

a. Diluir la concentración de orina.

b. Evitar la deshidratación.

c. Evitar la hipocalcemia.

d. Producir hormona antidiurética.

108. Una madre de familia con su hija adolescente de 14 años porque desde el último año ha presentado irregularidad en los ciclos menstruales. indica que la menarquía se presentó a los 12 años y 6 meses de edad y durante el primer año se presentaron todos los meses, no tiene antecedentes clínicos de importancia. al examen físico se aprecian caracteres sexuales secundarios presentes. la paciente no ha iniciado vida sexual activa. Los signos vitales son estables. el examen físico pediátrico no demuestra ninguna alteración y en el estudio de imagen de ecografía pélvica es normal.¿Cuál es la decisión a formar en esta paciente?

a. realizar un examen ginecológico minucioso

b. realizaron a laparoscopia diagnóstica

c. educación y orientación sobre el ciclo menstrual femenino

d. prescribir inductores de ovulación

e. dependencia

109. Paciente femenino de 35 años, con Alcoholismo Desde hace dos años, acude a su consulta porque ha decidido dejar de consumir alcohol ya que una semana antes de la consulta tuvo un accidente de tránsito. no refiere ingesta de medicación al momento se presenta asintomática. En el examen físico los signos vitales están estables, no hay signos patológicos. Se aplica el test de audit obteniendo la paciente una puntuación de cinco. con base en el resultado obtenido de la escala de audit.¿ cómo clasifica el consumo de alcohol en la paciente?

a. consumo abusivo

b. consumo de riesgo

c. riesgo bajo

110. Un niño de 10 años con diagnóstico de tuberculosis pulmonar inició el tratamiento antituberculoso hace 45 días, náuseas, diarrea, irritabilidad e hipoacusia. la madre preocupada por estos síntomas, ha interpuesto la medicación en lo que realiza una

visita domiciliaria sin encontrar a este núcleo familiar. ¿ En qué tipo de tratamiento se clasifica a este grupo?

- a. fracasó el tratamiento
- b. multidrogoresistencia MDR
- c. paciente curado
- d. pérdida en el seguimiento

111. Niño de 2 años, que hace 24 horas presenta estornudos, secreción nasal y tos no productiva. En examen paciente con temperatura de 37.2 °C. rinorrea, aleteo retronasal, cardiopulmonar y abdomen sin patología aparente. Si el diagnóstico es un resfriado común. ¿Cuánto tiempo, en lo posible, el niño debe evitar ir a la guardería para prevenir contagiar a sus compañeros?

- a. Desde 2 días desde el inicio de los síntomas hasta 2 semanas después,
- b. Desde 5 días después de iniciado los síntomas hasta una semana después.
- c. Desde el inicio de los síntomas hasta 2 semanas después.
- d. Desde el inicio de los síntomas hasta 6 días después.

112. El Centro de Salud Chimbacalle al ser de Tipo C atiende emergencias: para el triage ha instaurado un sistema en el cual recolectan todos los datos del paciente, con el fin de que los profesionales de salud dispongan de la información de manera oportuna y que facilite la toma de decisiones, la resolución de problemas y los procesos monitoreo y evaluación. Este sistema se complementa con una de las herramientas básica para la gestión e implementación del MAIS-FCI, como es el registro de información a través de la historia clínica única, que permite el análisis y toma de decisiones fundamentadas en hallazgos objetivos. ¿De qué tipo de sistema son parte estos sistemas e instrumentos de registro de información y clasificación de pacientes?

- a. Sistema de gestión administrativa.
- b. Sistema de gestión y planificación.
- c. Sistema de atención individual a usuarios.
- d. Sistema de vigilancia epidemiológica.


113. A inicios de 2019 se reporta la tendencia de la varicela en Ecuador de casos de varicela notificados hasta diciembre de 2018, 130 casos han sido notificados en la se2. los mismos que en su mayoría Fueron reportados por la provincia de pichincha 3488. los grupos de edad más afectados son los de 5 a 9 años y de 20 a 49 años el siguiente gráfico muestra la tendencia endémica de la varicela en el período 2016 al 2018.Llama la atención de la presencia de algunos picos en las curvas, Qué podrían

relacionarse con algunos brotes. ¿Cuál es la fuente de datos más común utilizada para construir este tipo de reportes de tendencias?

Varicela

En relación al año 2017 en donde se notificaron un total de 12451 casos de varicela, para el año 2018 los casos notificados aumentaron a 13781 casos, existiendo un incremento del 10.68%.

Grafico 9. Distribución de Varicela por semana epidemiológica. Periodo 2016- 2018.
Tendencia de Varicela por semanas epidemiológicas de los años 2016 - 2018



Fuente: SIVE-ALERTA 2018.

Elaborado por: Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

El grupo de edad más afectado durante el periodo 2018, es de 20 a 49 años de edad, siendo afectado equitativamente tanto en el sexo masculino como femenino.

a. Notificación de casos

b. encuestas

c. rumores

d. investigación de casos y brotes

114. Paciente mujer de 48 años y residente en Guano, refiere cefalea y fiebre de 2 semanas de evolución, vomito, desde hace 2 días y alteración de la conciencia en las últimas horas con irritabilidad. En la escala de coma de Glasgow de 13/15, existe meningismo. Se realiza una tomografía simple de cráneo lo cual es normal, luego de lo cual la punción lumbar revela líquido cefalorraquídeo, xantocrómico, transparente en la citoquímica linfocitosis, hiperproteinorraquia, hipogluorraquia leve. BAAR negativo. ¿Cuál es el manejo de diagnóstico y tratamiento?

a. Solicitar cultivo de Lowstein jensen e iniciar antibioticoterapia empírica con ceftriaxona que atraviesa la barrera hematoencefálica.

b. Solicitar tomografía contrastada de cráneo e iniciar tratamiento para absceso cerebral.

c. Solicitar PCR en tiempo real en LCR iniciar tratamiento anti tuberculosis de forma inmediata.

d. Solicitar resonancia magnética simple y contrastada de encéfalo como fondo de ojo y repetir BAAR en LCR en 24 horas.